

TIMCOX

TOLTRAZURIL... 2,5 %

> INDICATIONS :

Chez les poules (poulets de chair, poulettes et reproducteurs) et les dindes.

- Traitement de la coccidiose, due aux infestations par différentes espèces d'Eimeria:

Poules (gallus) : E. acervulina, E. brunetti, E. maxima, E. mitis, E. necatrix et E. tenella.

Dindes : E. adenoides et E. meleagrimitis.

> POSOLOGIE ET MODE D'EMPLOI :

La posologie est de 7 mg de toltrazuril par kg de poids vif et par jour (soit 0,28 ml de produit par kg de poids vif et par jour). Le traitement doit être administré deux jours de suite. Il est recommandé d'administrer le produit en continu sur une période de 24 heures par jour pendant 2 jours consécutifs,

> TEMPS D'ATTENTE :

Poules (gallus) : Viande et abats : 16 jours.

Dindes : Viande et abats : 16 jours.

Œufs : Ne pas utiliser chez les volailles produisant des œufs destinés à la consommation humaine.

Ne pas utiliser au cours des 6 semaines précédant le début de la ponte.

> PRÉSENTATIONS :

Flacon de 100 ml.

Flacon de 1 litre.

> DURÉE DE CONSERVATION :

24 mois

