

TILMO-300 ^{تيلمو}

TILMICOSINE (S.f Phosphate)... 30%

> INDICATIONS :

- Chez les bovins : - Traitement des affections respiratoires bovines associées à *Mannheimia haemolytica* et *Pasteurella multocida*.
- Traitement de la nérobacillose interdigitée.
- Chez les ovins : - Traitement des infections des voies respiratoires causées par *Mannheimia haemolytica* et *Pasteurella multocida*.
- Traitement de la mammité aigüe causée par *Staphylococcus aureus* et *Mycoplasma agalactiae*.
- Traitement du piétin du mouton causé par *Dichelobacter nodosus* et *Fusobacterium necrophorum*.

> CONTRE INDICATION :

- Ne pas administrer par voie intraveineuse. Ne pas administrer par voie intramusculaire.
Ne pas administrer aux agneaux pesant moins de 15 kg. Ne pas administrer aux primates.
Ne pas administrer aux porcs. Ne pas administrer aux chevaux et aux ânes. Ne pas administrer aux chèvres.
Ne pas administrer en cas d'hypersensibilité à la substance active ou à l'un des excipients.

> POSOLOGIE ET MODE D'EMPLOI :

Pour injection sous-cutanée seulement. Utiliser 10 mg de tilmicosine par kg de poids corporel (correspondant à 1 mL de TILMO-300 pour 30 kg de poids corporel).

> TEMPS D'ATTENTE :

- Bovins : Viande et abats : 70 jours. Lait : 36 jours.
Si le produit est administré aux vaches pendant la période de tarissement ou aux génisses laitières gestantes (conformément à la rubrique « Utilisation en cas de gestation, de lactation ou de ponte » ci-dessus), le lait ne doit pas être utilisé pour la consommation humaine jusqu'à 36 jours après le vêlage.
- Ovins : Viande et abats : 42 jours. Lait : 18 jours.
Si le produit est administré aux brebis pendant la période de tarissement ou aux brebis gestantes (conformément à la rubrique « Utilisation en cas de gestation, de lactation ou de ponte » ci-dessus), le lait ne doit pas être utilisé pour la consommation humaine jusqu'à 18 jours après l'agnelage.

> PRÉSENTATION :

Flacon 50 ml - Flacon 100 ml

> DURÉE DE CONSERVATION :

- Durée de conservation du médicament vétérinaire tel que conditionné pour la vente : 24 mois.
Durée de conservation après première ouverture du conditionnement primaire : 28 jours.

