

TIMOL

TILMICOSINE (Sous forme Phosphate)... 25%

> INDICATIONS :

- **Poulets et dindes** : Traitement des manifestations des infections respiratoires associées à *Mycoplasma gallisepticum* et *Mycoplasma synoviae*.
- **Veaux** : Traitement des manifestations des infections respiratoires bovines, associées à *mannheimia haemolytica*, *Pasteurella multocida*, *Mycoplasma bovis*, *Mycoplasma Dispar*.

> CONTRE INDICATION :

Ne pas administrer aux poules pondeuses produisant des œufs pour la consommation humaine.

> POSOLOGIE ET MODE D'EMPLOI :

- **Poulets** : 15 à 20 mg/Kg/jour pendant 3 jours ce qui équivaut à 75 mg de tilmicosine par litre d'eau (30 ml de Timol par 100 litres) pendant 3 jours.
- **Dindes** : 10 à 27 mg/Kg/jour pendant 3 jours ce qui équivaut à 75 mg de tilmicosine par litre d'eau (30 ml de Timol par 100 litres) pendant 3 jours.
- **Veaux** : 12,5 mg/Kg de poids corporel, ce qui équivaut au mélange au lait reconstitué de 1 ml de TIMOL par 20 Kg de poids corporel deux fois par jour pendant 3 à 5 jours.

> TEMPS D'ATTENTE :

- **Poulets** : 12 jours • **Dindes** : 19 jours • **Veaux** : 42 jours

> PRÉSENTATION :

Flacon 150 ml

> DURÉE DE CONSERVATION :

24 mois

