

DOXYMAX

Doxycycline (Hyclate) 10%

> COMPOSITION CENTÉSIMALE:

Doxycycline (s.f hyclate).....10 g Excipients qsp100 ml

> INDICATIONS :

Chez les poulets , dans les maladies provoquées par les micro-organismes sensibles à la Doxycycline :

- Infections des voies respiratoires (Maladie respiratoire chronique MRC et les Mycoplasmoses).

> POSOLOGIE ET MODE D'EMPLOI :

A administrer dans l' eau de boisson :

11,5 à 23 mg d' hyclate de Doxycycline par kg de poids vif et par jour soit 0,1 à 0,2 ml de DOXYMAX par kg de poids vif pendant 3 à jours consécutifs

> CONTRE INDICATION :

Ne pas utiliser chez les animaux atteints d'insuffisance hépatique. Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité aux tétracyclines.

> INTERACTIONS :

L'absorption de doxycycline peut diminuer en présence d'ions de ca, fer, mg ou aluminium dans la diète.

> EFFETS SECONDAIRES :

Photosensibilisation. En traitements très prolongés peuvent apparaitre des altérations digestives par dysbiose intestinale.

> DÉLAIS D'ATTENTE :

Poulets de chair : 7 jours.

Ne pas utiliser chez les espèces pondeuses productrices d' oeufs de consommation 4 semaines avant le démarrage de la ponte et pendant celle-ci

> DURÉE ET CONDITIONS DE CONSERVATION:

Dans les conditions normales de température et d'hygrométrie pendant 24 mois dans son conditionnement d'origine, bien fermé.Tenir hors de la portée des enfants.

> CATÉGORIE ET CONDITIONS DE DÉLIVRANCE :

A ne délivrer que sur ordonnance médicale. Liste I..

> PRESENTATION :

Flacon de 1 Litre



**SOLUTION
BUVABLE**

