

# MARBOTIM

MARBOFLOXACINE 160 MG/ML

## > INDICATIONS :

- Chez les bovins : Traitement curatif des infections respiratoires causées par des souches sensibles de *Pasteurella multocida* et *Mannheimia haemolytica*.
- Chez les vaches en lactation : Traitement des mammites aigües causées par des souches sensibles d'*Escherichia coli*.

## > ADMINISTRATION ET POSOLOGIE :

Pour garantir un dosage correct, il convient de déterminer le poids vif aussi précisément que possible afin d'éviter un sous-dosage.

En cas de léger trouble ou de présence de particules visibles, ceux-ci disparaissent lorsque le flacon est agité avant l'utilisation.

- Traitement curatif des infections respiratoires : 10 mg de marbofloxacine par kg de poids vif soit 10 ml/160 kg de poids vif en une administration intramusculaire unique.
- Traitement des mammites aigües causées par des souches sensibles d'*Escherichia coli* : 10 mg de marbofloxacine par kg de poids vif soit 10 ml/160 kg de poids vif en une administration intramusculaire ou intraveineuse unique.

Si le volume à administrer par voie intramusculaire est supérieur à 20 ml, répartir la dose en 2 points d'injection minimum.

## > TEMPS D'ATTENTE :

Viandes et abats : 5 jours    Lait : 48 heures.

## > DURÉE DE VALIDITÉ & CONSERVATION :

Durée de conservation du médicament vétérinaire tel que conditionné pour la vente : 2 ans.  
Durée de conservation après première ouverture du conditionnement primaire : 28 jours.

## > PRÉSENTATIONS :

Flacon de 100 ml

